

Tableau 1

## Liste des pays pour lesquels il est nécessaire de prendre une chimioprophylaxie antipaludique en 2006

| Pays (1)           | Situation du paludisme 2006/<br>chimioprophylaxie (2)         | Pour un séjour de moins<br>de 7 jours : chimio-<br>prophylaxie facultative (3) | Pays (1)                                       | Situation du paludisme 2005/<br>chimioprophylaxie (2)  | Pour un séjour de moins<br>de 7 jours : chimio-<br>prophylaxie facultative (3)                            |
|--------------------|---|--|--|--|---|
| Afghanistan        | groupe 3  | pour l'ensemble du pays  | Malaisie                                       | zones urbaines ou côtières :<br>pas de chimioprophylaxie ; ailleurs : groupe 3   |   |
| Afrique du Sud     | Nord-Est : groupe 3<br>ailleurs : pas de chimioprophylaxie    |  | Malawi   | groupe 3   |   |
| Angola             | groupe 3  |  | Mali   | groupe 2   |   |
| Arabie Saoudite    | Sud, Ouest : groupe 3<br>ailleurs : pas de chimioprophylaxie  | pour l'ensemble du pays  | Mauritanie                                     | groupe 2   |   |
| Argentine (*)      | Nord : groupe 1<br>ailleurs : pas de chimioprophylaxie        | pour l'ensemble du pays  | Mayotte (collectivité<br>départementale)       | groupe 3   | pour l'ensemble du pays   |
| Bangladesh         | Dacca : pas de chimioprophylaxie<br>reste du pays : groupe 3  |  | Mexique (*)                                    | groupe 1   | pour l'ensemble du pays   |
| Belize (*)         | groupe 1  | pour l'ensemble du pays  | Mozambique                                     | groupe 3   |   |
| Bénin              | groupe 3  |  | Myanmar<br>(ex-Birmanie)                       | groupe 3   |   |
| Bhoutan            | groupe 3  | pour l'ensemble du pays  | Namibie  | groupe 3   |   |
| Bolivie            | Amazonie : groupe 3<br>ailleurs (*) : groupe 1                | pour l'ensemble du pays  | Népal  | Terai : groupe 2<br>ailleurs : pas de chimioprophylaxie  |   |
| Botswana           | groupe 3  |  | Nicaragua (*)                                  | groupe 1   | pour l'ensemble du pays   |
| Brsil              | Amazonie : groupe 3<br>ailleurs : pas de chimioprophylaxie    |  | Niger  | groupe 2   |   |
| Burkina Faso       | groupe 2  |  | Nigeria  | groupe 3   |   |
| Burundi            | groupe 3  |  | Ouganda  | groupe 3   |   |
| Cambodge           | groupe 3  |  | Pakistan                                       | groupe 3   |   |
| Cameroun           | groupe 3  |  | Panama (*)                                     | Ouest : groupe 1<br>Est : groupe 3   | pour Panama Ouest   |
| Chine              | Yunnan et Hainan : groupe 3<br>Nord-Est (*) : groupe 1        | pour l'ensemble du pays<br>sauf Yunnan et Hainan                               | Papouasie-<br>Nouvelle Guinée                  | groupe 3   |   |
| Colombie           | Amazonie : groupe 3<br>ailleurs : groupe 2                    |  | Paraguay                                       | Est (*) : groupe 1<br>ailleurs : pas de chimioprophylaxie  | pour l'ensemble du pays   |
| Comores            | groupe 3  |  | Pérou  | Amazonie : groupe 3<br>ailleurs (*) : groupe 1   | pour l'ensemble du pays<br>sauf l'Amazonie  |
| Congo              | groupe 3  |  | Philippines                                    | groupe 3   |   |
| Costa Rica (*)     | groupe 1  | pour l'ensemble du pays  | République dominicaine                         | groupe 1   |   |
| Côte-d'Ivoire      | groupe 3  |  | République centrafricaine                      | groupe 3   |   |
| Djibouti           | groupe 3  |  | République démocratique<br>du Congo (ex-Zaire) | groupe 3   |   |
| Équateur           | Amazonie : groupe 3<br>ailleurs : groupe 1                    |  | Rwanda   | groupe 3   |   |
| Érythrée           | groupe 3  |  | El Salvador (*)                                | groupe 1   | pour l'ensemble du pays   |
| Éthiopie           | groupe 3  |  | Sao Tomé et Príncipe                           | groupe 3   |   |
| Gabon              | groupe 3  |  | Salomon (Iles)                                 | groupe 2   |   |
| Gambie             | groupe 3  |  | Sénégal  | groupe 3   |   |
| Ghana              | groupe 3  |  | Sierra Leone                                   | groupe 3   |   |
| Guatemala (*)      | groupe 1  | pour l'ensemble du pays  | Somalie  | groupe 3   |   |
| Guinée             | groupe 3  |  | Soudan   | groupe 3   |   |
| Guinée-Bissau      | groupe 3  |  | Sri Lanka (*)                                  | groupe 2   | pour l'ensemble du pays   |
| Guinée Équatoriale | groupe 3  |  | Surinam  | groupe 3   |   |
| Guyana             | groupe 3  |  | Swaziland                                      | groupe 3   |   |
| Guyane française   | fleuves : groupe 3<br>zone côtière : pas de chimioprophylaxie |  | Tadjikistan (*)                                | groupe 2   | pour l'ensemble du pays   |
| Haïti              | groupe 1  |  | Tanzanie                                       | groupe 3   |   |
| Honduras (*)       | groupe 1  | pour l'ensemble du pays  | Tchad  | groupe 2   |   |
| Inde               | État d'Assam : groupe 3<br>ailleurs : groupe 2                |  | Thaïlande                                      | Régions frontalières avec le Cambodge,<br>le Laos, le Myanmar et la Malaisie : groupe 3<br>ailleurs : pas de chimioprophylaxie | pour l'ensemble du pays<br>sauf les frontières avec<br>le Cambodge, le Laos,<br>le Myanmar et la Malaisie |
| Indonésie          | Bali : pas de chimioprophylaxie<br>ailleurs : groupe 3        |  | Timor Oriental                                 | groupe 3   |   |
| Iran               | Sud-Est : groupe 3<br>ailleurs (*) : groupe 1                 | pour l'ensemble du pays  | Togo   | groupe 3   |   |
| Iraq (*)           | groupe 1  | pour l'ensemble du pays  | Vanuatu  | groupe 2   |   |
| Kenya              | groupe 3  |  | Venezuela (Amazonie)                           | Amazonie : groupe 3<br>ailleurs (*) : groupe 1   |   |
| Laos               | groupe 3  |  | Vietnam  | Bande côtière et deltas :<br>pas de chimioprophylaxie<br>ailleurs : groupe 3   | pour la bande côtière<br>et les deltas  |
| Libéria            | groupe 3  |  | Yemen  | groupe 3   |   |
| Madagascar         | groupe 2  |  | Zambie   | groupe 3   |   |
|                    |   |  | Zimbabwe                                       | groupe 3   |   |

(\*) Essentiellement *Plasmodium vivax*

(1) Pour l'Afrique, une bonne connaissance des zones de résistances visitées par les voyageurs français permet de distinguer une zone 2 et une zone 3. Cette distinction n'apparaît pas dans les recommandations de l'OMS et du CDC. Il faut noter une modification de la classification OMS depuis 2005 qui définit 4 types de prévention du risque Paludisme (I, II, III, IV) en combinant le risque de paludisme et le niveau de chimiorésistance.

(2) Groupe 1 : chloroquine ; groupe 2 : chloroquine+proguanil ou atovaquone+proguanil ; groupe 3 : méfloquine ou atovaquone+proguanil ou doxycycline ; cf chapitre 2.2.3

(3) Dans ces régions, il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour inférieur à 7 jours, à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en cas de fièvre.